



Copyright disclaimer

"La faculté" is a website that collects copyrights-free medical documents for non-lucrative use.

Some articles are subject to the author's copyrights.

Our team does not own copyrights for some content we publish.

"La faculté" team tries to get a permission to publish any content; however, we are not able to contact all the authors.

If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on:
facadm16@gmail.com

All users must know that "La faculté" team cannot be responsible anyway of any violation of the authors' copyrights.

Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up.



MODULE DE MALADIES INFECTIEUSES
ANNEE UNIVERSITAIRE 2010-2011 2^{ème} PERIODE

EPREUVE DE MICROBIOLOGIE

1- Le traitement d'une infection urinaire nécessite la prise en compte des éléments suivant (cocher la réponse fausse) :

- a. La clinique
- b. La bactériologie
- c. L'épidémiologie
- d. La pharmacologie
- ☒ e. L'incubation

2- La mise en culture du LCR permet : (cocher la réponse juste)

- ☒ a. D'isoler le germe responsable de la méningite
- b. D'identifier la bactérie responsable de la méningite
- c. De tester la sensibilité aux antibiotiques de la bactérie responsable de la méningite
- d. Toutes ces réponses sont justes
- e. Aucune de ces réponses n'est juste

3- Les bactéries les plus fréquemment retrouvées dans les infections urinaires communautaires (cocher la réponse juste) :

- a. *E. coli*, *Pseudomonas*, *Entérocoque*
- ☒ b. *E. coli*, *Klebsiella*, *Proteus*, *Staphylococcus saprophyticus*
- c. *E. coli*, *Acinetobacter*, *Serratia*
- d. *E. coli*, *Streptocoque* du groupe A, *Enterobacter*
- e. *E. coli*, *Staphylococcus aureus*, *Candida albicans*

4- Tous ces agents infectieux sont pathogènes opportunistes : (cocher la réponse fausse)

- a. *Serratia marcescens*
- b. *Pseudomonas aeruginosa*
- ☒ c. *Salmonella para-typhi B*
- d. *Staphylococcus epidermidis*
- e. *Candida albicans*

5 - Une souche de *Klebsiella pneumoniae* BLSE+ est une souche :

- a. Résistante uniquement aux Céphalosporines de 3^{ème} génération
- b. Résistante à toutes les Bêtalactamines
- c. Résistante à toutes les Bêtalactamines sauf l'Imipenem
- ☒ d. Résistante à toutes les Bêtalactamines sauf Cefoxitine et Imipenem
- e. Résistante à toutes les Bêtalactamines et aux Aminosides

6 - Les méningites tuberculeuses sont caractérisées par leur : (cocher la réponse juste)

- a. Réaction cellulaire habituellement lymphocytaire
- ☒ b. Richesse en BAAR à l'examen direct
- c. Glycorachie élevée → Hypoglycorachie
- d. Réaction cellulaire habituellement panachée
- e. Protéinorachie habituellement basse F Hyperalbuminorachie

- 7- Les cellules qui peuvent être infectées par le **VIH** sont (cocher la réponse fausse) :
- ☒ a- Les cellules musculaires striées
 - b- Les cellules lymphoïdes CD4 + où le virus pénètre et peut rester à l'état latent et où le virus se réplique en abondance ✓
 - c- Les cellules macrophagiques présentatrice d'antigènes ; ✓
 - d- Les cellules fibroblastiques, intestinales, nerveuses ; ✓
 - e- Les cellules de Langerhans. ✓

- 8- Le diagnostic d'une primo-infection génitale à **HSV** peut être fait par ; (cocher la réponse fausse)

- ☒ a- la détection d'antigène viral par immunofluorescence directe dans les cellules
- b- la constatation d'un titre élevé d'anticorps neutralisants (> au 1/64) au décours de l'infection
- c- l'isolement du virus en culture cellulaire à partir du contenu des vésicules
- d- la constatation d'une séroconversion ou l'ascension du taux des anticorps entre un prélèvement précoce et un prélèvement tardif.
- e- a+c

- 9- L'infection par le **VIH** passe par plusieurs phases cliniques successives (cocher la réponse fausse) :

- a- La primo-infection
- b- La phase asymptomatique
- ☒ c- La phase catarrhale oculo-naso-bronchique pathognomonique
- d- La phase pré-SIDA
- e- La phase SIDA

- 10- Parmi les ^{IST} infections sexuellement transmissibles suivantes, quelle est celle qui donne des ulcérations au niveau de la sphère génitale (cochez la réponse fausse)

- a- la Syphilis
- b- le chancre mou
- c- l'Herpès génital
- d- la Donovanose
- ☒ e- la Bartholinite

- 11- Tous ces virus sont responsables d'encéphalite infectieuse (sauf un) :

- a- virus de la rougeole
- b- virus des oreillons
- c- virus Epstein Barr (EBV)
- ☒ d- virus de la grippe
- e- virus de la rubéole

- 12- Les bactéries anaérobies sont impliquées dans toutes les infections suivantes sauf une laquelle :

- ☒ a- furoncle
- b- abcès du poulmon
- c- infections péviennes
- d- abcès du foie
- e- péritonites